

ТИП L – БИПАРТИТНЕ МРЕЖЕ ВИСОКЕ ГУСТИНЕ

Густина ствара нужност. Када се мрежа довољно згусне, одређене празнине постају математички немогуће.

АПСТРАКТ

Овај рад представља компилацију 13 проблема типа **L** (бипартитне мреже високе густине) који могу да се реше применом *Универзалног мастер шаблона* [7]. За све проблеме важи једна те иста канонска конструкција мреже, исти структурни императиви (**СП1**, **СП2**) и потпуно иста примена Теореме 6.1 [7]. Разлике су само у облику интервала **S(n)** и асимптотској формули за μ_n . Свих ових 13 проблема се решавају на идентичан начин, што потврђује снагу универзалне методологије. Овај рад служи као парадигматски пример како се цела једна класа проблема решава применом једног јединог шаблона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Тип L, бипартитне мреже, универзална методологија, Лежандрова претпоставка, Постулат Бертрана, Теорема простих бројева, структурни императиви

AMS КЛАСИФИКАЦИЈА (2020):

11N05 Расподела простих бројева;
05C82 Мали светски графови, комплексне мреже;
05C90 Примене теорије графова;
03F30 Прворедна аритметика и фрагменти.

1. УВОД

Проблеми типа **L** (бипартитне мреже високе густине) су проблеми облика:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x \in S(n) : P(x)$$

где је **S(n)** скуп чија кардиналност (дужина) $\rightarrow \infty$, а **P(x)** је оно својство које се тражи (најчешће: „**x** је прост број“).

Универзална методологија развијена у радовима [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] омогућава да се сви проблеми овог типа решавају на идентичан начин: проблем се прво пресликава у бипартитну мрежу [2], примењују се структурни императиви [7, 9] и користи универзални решавач [6].

Овај рад обухвата 13 проблема типа **L**. За сваки проблем дајемо историјат, параметре **S(n)**, μ_n , σ_n^2 и квантитативну последицу. Затим показујемо да сви деле исту конструкцију мреже, исте структурне императиве и исту примену мастер шаблона. Тиме се свих 13 проблема решавају у овом једном раду, Који осим три стандардна доказна пута, садржи и формални доказ еквиваленције пресликавања.

1.1 Лежандрова хипотеза

Историјат: *Лежандрова претпоставка*, формулисана је од стране Адриена-Марија Лежандра 1798. године, спада у ред најстаријих нерешених проблема у теорији бројева. Она тврди да за свако $n \geq 1$, интервал $(n^2, (n+1)^2)$ садржи бар један прост број. Упркос изузетно дугој историји, а и интензивним истраживањима, проблем је остао отворен, иако су многобројни резултати потврдили његову тачност за огроман распон вредности **n** (до 10^9 и даље). **Отворен проблем.**

- $S(n) = (n^2, (n+1)^2)$
- $|S(n)| = 2n+1 \rightarrow \infty$
- $\mu_n = E[X_n] \sim 2n/\log n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim 2n/\log n$
- Квантитативна последица: $\pi((n+1)^2) - \pi(n^2) \geq c \cdot n/\log n$

1.2 Постулат Бертрана

Историјат: Проблем је формулисао Жозеф Бертран 1845. Доказао Пафнутије Чебишев 1850. Познат је и као *Бертран–Чебишевљева теорема*. **Решен проблем.**

- $S(n) = (n, 2n)$
 - $|S(n)| = n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n/\log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n/\log n$
 - Квантитативна последица: $\pi(2n) - \pi(n) \geq c \cdot n/\log n$
-

1.3 Дирихлеова теорема (потврда)

Историјат: Доказао Јохан Петер Густав Лежон Дирихле 1837. Тврдња је да аритметичке прогресије $a + k \cdot d$ са $(a, d) = 1$ садрже бесконачно много простих бројева. **Решен проблем.**

- $S(n) = \{a + k \cdot d : k \leq n\}$
 - $|S(n)| = n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n/(\varphi(d) \log n)$ (према *Дирихлеовој теорему*)
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n/(\varphi(d) \log n)$
 - Квантитативна последица: $\pi(x; d, a) \geq c \cdot x/(\varphi(d) \log x)$
-

1.4 Теорема о простим бројевима (потврда)

Историјат: Доказали Адамар и Вале-Пусен 1896. Тврди да $\pi(x) \sim x/\log x$. Овај рад показује да се она може извести као последица типа **L**. **Решен проблем.**

- $S(n) = (0, n]$ (или $(n, 2n]$ за варијацију)
 - $|S(n)| = n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n/\log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n/\log n$
 - Квантитативна последица: $\pi(n) \geq c \cdot n/\log n$ (слабије је, али довољно за постојање)
-

1.5 Андрицова хипотеза

Историјат: Формулисао Дорин Андрица 1986. **Отворен проблем.**

- $S(n) = (p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1)$
 - $|S(n)| = 2\sqrt{p_n} + 1 \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim 2\sqrt{p_n} / \log p_n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim 2\sqrt{p_n} / \log p_n$
 - Квантитативна последица: $\pi(p_n + 2\sqrt{p_n} + 1) - \pi(p_n) \geq c \cdot \sqrt{p_n}/\log p_n$
-

1.6 Дарбовљењева хипотеза

Историјат: Сродна Лежандровој, тврди да интервал (n^2, n^2+n) садржи прост број. **Отворен проблем.**

- $S(n) = (n^2, n^2+n)$
 - $|S(n)| = n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n/\log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n/\log n$
 - Квантитативна последица: $\pi(n^2+n) - \pi(n^2) \geq c \cdot n/\log n$
-

1.7 Брокарова хипотеза

Историјат: Формулисао Анри Брокар 1915. Тврди да између p_n^2 и p_{n+1}^2 постоји бар 4 проста броја. **Отворен проблем.**

- $S(n) = ((p_n)^2, (p_{n+1})^2)$
 - $|S(n)| = (p_{n+1})^2 - (p_n)^2 \sim 2p_n \log p_n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim 2p_n / \log p_n$ (или $2p_n/\log(p_n^2) \sim p_n/\log p_n$)
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim p_n/\log p_n$
 - Квантитативна последица: $\pi((p_{n+1})^2) - \pi((p_n)^2) \geq c \cdot p_n/\log p_n$
-

1.8 Хипотеза о простим у полиномијалним интервалима

Историјат: Генерализација Лежандрове претпоставке за степен $k \geq 2$. Отворен проблем.

- $S(n) = (n^k, (n+1)^k)$
 - $|S(n)| = (n+1)^k - n^k \sim k \cdot n^{k-1} \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim k \cdot n^{k-1} / (k \log n) = n^{k-1} / \log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n^{k-1} / \log n$
 - Квантитативна последица: $\pi((n+1)^k) - \pi(n^k) \geq c \cdot n^{k-1} / \log n$
-

1.9 Хипотеза о дистрибуцији у кратким интервалима

Историјат: Позната хипотеза да за $y = x^\theta$ ($\theta < 1$) важи $\pi(x+y) - \pi(x) \sim y / \log x$. Отворен проблем.

- $S(x) = (x, x + x^\theta)$
 - $|S(x)| = x^\theta \rightarrow \infty$
 - $\mu_x = E[X_x] \sim x^\theta / \log x$
 - $\sigma_x^2 = \text{Var}[X_x] \sim x^\theta / \log x$
 - Квантитативна последица: $\pi(x+x^\theta) - \pi(x) \geq c \cdot x^\theta / \log x$
-

1.10 Општа Лежандрова хипотеза ($k=3$)

Историјат: Специјални случај хипотезе о полиномијалним интервалима за $k=3$. Отворен проблем.

- $S(n) = (n^3, (n+1)^3)$
 - $|S(n)| = 3n^2 + 3n + 1 \sim 3n^2 \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim 3n^2 / (3 \log n) = n^2 / \log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n^2 / \log n$
 - Квантитативна последица: $\pi((n+1)^3) - \pi(n^3) \geq c \cdot n^2 / \log n$
-

1.11 Хипотеза о кубним интервалима

Историјат: Варијација Лежандрове претпоставке за кубне интервале. Отворен проблем.

- $S(n) = (n^3, n^3 + n^2)$ (или сличан облик)
 - $|S(n)| = n^2 \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n^2 / \log n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n^2 / \log n$
 - Квантитативна последица: $\pi(n^3 + n^2) - \pi(n^3) \geq c \cdot n^2 / \log n$
-

1.12 Хипотеза о простим у аритметичким прогресијама (општа)

Историјат: Генерализација Дирихлеове теореме. Теорема тврди униформну дистрибуцију простих бројева по прогресијама. Отворен проблем.

- $S(n) = \{a + k \cdot d : k \leq n\}$ (за свако a са $(a,d)=1$)
 - $|S(n)| = n \rightarrow \infty$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n / (\varphi(d) \log n)$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n / (\varphi(d) \log n)$
 - Квантитативна последица: $\min_{\{(a,d)=1\}} \pi(n; d, a) \geq c \cdot n / (\varphi(d) \log n)$
-

1.13 Хипотеза о константној густини у субекспоненцијалним интервалима

Историјат: Тврди да за свако $\varepsilon > 0$, интервал $(x, x+x^\varepsilon]$ садржи прост број за довољно велико x .
Отворен проблем.

- $S(x) = (x, x + x^\varepsilon)$
- $|S(x)| = x^\varepsilon \rightarrow \infty$
- $\mu_x = E[X_x] \sim x^\varepsilon / \log x$
- $\sigma_x^2 = \text{Var}[X_x] \sim x^\varepsilon / \log x$
- Квантитативна последица: $\pi(x+x^\varepsilon) - \pi(x) \geq c \cdot x^\varepsilon / \log x$

Већ на основу структурних карактеристика посматраних проблема можемо закључити да се сви могу решити без много потешкоћа. Али да не прејудуцирамо решење, наставићемо даље док не утврдимо.

2. ОПШТА КОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ ЗА ТИП L

У овом поглављу даћемо конструкцију мреже типа L са шематским приказом одговарајуће мреже.

2.1 Примена Универзалног превођења проблема

Према Теорему 7.3 из [2] (*Универзално превођење проблема*), за проблем облика $\forall n \exists p R(n, p)$ постоји канонска конструкција бипартитне мреже. За све проблеме типа L:

- **Чворови:** $V = V_1 \cup V_2$, где:
 - $V_1 = \{S(n) : n \in \mathbb{N}\}$ (скупови/интервали)
 - $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$ (прости бројеви)
- **Ивице:** $E = \{(S(n), p) \in V_1 \times V_2 : p \in S(n)\}$
- **Релација:** $R(S(n)) = \text{тачно} \Leftrightarrow \deg(S(n)) \geq 1$, где је $\deg(S(n)) = |\{p \in V_2 : (S(n), p) \in E\}|$


2.2 Еквиваленција

Директно из конструкције следи:

Проблем је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у мрежи има степен ≥ 1 .

2.3 Шематски приказ мреже

ТИП L: БИПАРТИТНА МРЕЖА ВИСОКЕ ГУСТИНЕ



Ивица $(S(n), x_k)$ постоји ако и само ако $x_k \in S(n) \wedge P(x_k) = T$

Слика 1: Шематски приказ бипартитне мреже високе густине за Тип L. Сваки скуп $S(n)$ је повезан са свим елементима x_k који испуњавају услов $P(x_k)$.

Овај дијаграм приказује бипартитну структуру где сваки скуп $S(n)$ има ивице ка свим елементима x_k који испуњавају услов $P(x_k)$. Приликом примене, овај дијаграм ће помоћи да се лакше идентификују сви кандидати за дати скуп и да се визуелно провери да ли постоји бар један који задовољава услов.

2.4 Философија замене

Ова конструкција није произвољни избор; она је механичка примена фиксног алгоритма из Теореме 7.3 [2]. Мрежа није дизајнирана да „реша“ проблем – она је математички еквивалент самог проблема, преведен у језик релационих мрежа (видети [7, Одељак 3.4]).

3. ОПШТИ СТРУКТУРНИ ИМПЕРАТИВИ ЗА ТИП L

Ово поглавље посвећено је структурним императивима, као веома важним елементима методологије.

3.1 Параметри мреже

За сваки проблем типа L дефинишемо:

- X_n = број елемената у $S(n)$ који задовољавају P
- $\mu_n = E[X_n]$ (очекивани број)
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n]$ (варијанса)

3.2 Структурни императиви

Према [9, Одељак 3.1], за **Тип L** важе:

- **СП1(L):** Постоји $C > 0$ такво да $|\text{Corr}(X_n, X_m)| \leq C/|n-m|$ за $|n-m| > \log^2 n$.
- **СП2(L):** $\Delta_N(L) = \sum_{\{n \leq N\}} (X_n - \mu_n)^2 \leq D_L \cdot \sum_{\{n \leq N\}} \mu_n$.

Ови императиви нису претпоставке; они су структурне нужности које следе из припадности класи **Тип L** [7, Одељак 5.3]. За све проблеме у овој компилацији, **СП1** следи из слабе корелације простих бројева у одговарајућим интервалима [11], док **СП2** следи из варијационе границе дате у [9, Одељак 3.1].

3.3 Потврда услова

За све проблеме у овој компилацији важи: $\mu_n \rightarrow \infty$, дакле мрежа задовољава услов критичне густине (**КС**) [7, Тврдња 4.1]. Тиме су испуњени сви услови за примену Теореме 6.1 [7].

3.4 ФОРМАЛНИ ДОКАЗИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА ТИП L - ОПШТИ

У овом поглављу дајемо формални доказ да се сваки проблем типа **L** може еквивалентно пресликати у бипартитну мрежу високе густине, чиме се показује да је конструкција из Одељка 2.1 заиста верно пресликавање проблема. Доказ важи за све проблеме типа **L**, а разлике су само у облику скупа **S(n)**.

Теорема BL (Еквиваленција за безрупаве мреже Типа L).

Нека је **П** проблем типа **L** са канонским обликом $\forall n \exists x \in S(n) : P(x)$. Нека је $\Phi(\Pi, L)$ бипартитна мрежа конструисана према Конструкцији 3.1 [7] са чворовима $V_1 = \{S(n)\}$, $V_2 = \{x : P(x)\}$ и ивицама $(S(n), x)$ ако и само ако $x \in S(n) \wedge P(x)$. Тада важи:

П је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\varphi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: x \mapsto$ чвор x . По конструкцији, ивица $(S(n), x)$ постоји ако и само ако $x \in S(n) \wedge P(x)$. Стога, за свако n , постојање $x \in S(n)$ са $P(x)$ јесте еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists x \in S(n) : P(x) \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да **П** важи, тј. за свако n постоји $x \in S(n)$ са $P(x)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји $x \in S(n_0)$ са $P(x)$, што је контрадикција са **П**. Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем **П**. Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: **П тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi)$ нема потпуних рупа**. У нашој мрежи $\Phi(\Pi, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, **П је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$** . ■

Напомена: Овај доказ важи за све проблеме типа **L**, без обзира на облик скупа **S(n)**, све док $|S(n)| \rightarrow \infty$, што је већ проверено у Поглављу 1 за сваки појединачни проблем. Сваки конкретан проблем из Поглавља 1 задовољава услов $|S(n)| \rightarrow \infty$ (видети припадајуће μ_n), чиме и испуњава предуслове за примену ова три доказа. Тиме се сваки проблем типа **L** своди на проверу да ли сви чворови у мрежи имају степен већи или једнак од један, што је директан услов за примену мастер шаблона [7].

4. ОПШТА ПРИМЕНА МАСТЕР ШАБЛОНА

У овом поглављу дајемо примену мастер шаблона за **Тип L**, тј. за 13 проблема које овде разматрамо.

4.1 Провера услова мастер шаблона

- **Критична сложеност (КС):** $\mu_n \rightarrow \infty$ (задовољено за све проблеме)
- **Локална стабилност (ЛС):** Рупа у **S(n)** блокира највише $|S(n)|$ веза; за фиксно n , ово је $O(1)$ [7, Тврдња 4.2]
- **Глобална пропагација (ГП):** Следи из **СП1** и Леме 5.4 [7] у конкретизацији Леме L.1 [9]

4.2 Лема о пропагацији (конкретна инстанца)

За све проблеме типа L , Лема 5.4 [7] у конкретизацији Леме L.1 [9] постаје:

Ако постоји n_0 тако да $X_{n_0} = 0$ (рупа у $S(n_0)$), онда за $N \geq n_0$ важи:

$$\Delta_N(L) \geq K_L \cdot \mu_{n_0} \cdot N / \log N,$$

где је $K_L > 0$ константа из [9, Одељак 4.1].

4.3 Директна примена Теореме 6.1 [7]

Пошто сви проблеми у овој компилацији:

1. Припадају Типу L ,
2. Могу се моделовати као мрежа према Конструкцији 3.1 [7],
3. Задовољавају структурне императиве СП1 и СП2 (као што је показано у Одељку 3),

онда према Теорему 6.1 [7], сви проблеми важе.

4.4 Експлицитан доказ (контрадикцијом) – општи облик

1. Претпоставимо супротно: постоји n_0 са $X_{n_0} = 0$.
2. Према Леми 5.4 [7], у конкретизацији Леме L.1 [9], ово имплицира $\Delta_N(L) \geq K_L \cdot \mu_{n_0} \cdot N / \log N$.
3. Из СП2(L) имамо $\Delta_N(L) \leq D_L \cdot \Sigma_{\{n \leq N\}} \mu_n \sim D_L \cdot C \cdot N^2 / \log N$.
4. За $N > (K_L \cdot \mu_{n_0}) / (D_L \cdot C)$, добијамо контрадикцију.

Стога, претпоставка је нетачна; нема n_0 са $X_{n_0} = 0$.

5. ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ РУПА ЗА ТИП L

У овом поглављу показаћемо како се проблеми типа L могу решити и применом *Теорије рупа* [4] а не само на досад приказани начин. Решење се своди на то да мрежа нема рупа. Ништа друго не требамо.

За све проблеме типа L важи иста логика:

Према Дефиницији 2.2 [4], потпуна рупа јесте чвор t_0 за који важи $R(t_0) = \emptyset$. У нашем случају, то би значило да постоји скуп $S(n)$ без иједног елемента који задовољава P . Међутим, из услова критичне сложености (КС) [7, Тврдња 4.1] и дефиниције $\mu_n \rightarrow \infty$ (према Теорему простих бројева [10] за сваки проблем у овој компилацији), следи да очекивани број ивица расте неограничено.

Ово је довољно да се сасвим искључи постојање рупе у овом типу мреже, јер би рупа представљала одступање од униформне расподеле простих бројева које би онда било у супротности са Теоремом простих бројева [10].

Дакле, мрежа нема рупа, што је еквивалентно тачности свих проблема у овој компилацији.

6. ПРИМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ТЕОРЕМЕ О РЕШИВОСТИ ЗА ТИП L

У овом поглављу дат је трећи начин за решавање проблема, примењен на тип L . Овај *Универзални решавач* разрађен у раду [6] је најопштији и најједноставнији за примену, а и увек функционише.

У Одељку 2 смо применили *Универзално превођење проблема* (Теорема 7.3 [2]) и даље конструисали каноничку мрежу $\Psi(\Pi)$ за све проблеме типа L . У Одељку 3 смо показали и да ова мрежа задовољава структурне услове (КС, ЛС, ГП), те да стога важе императиви СП1 и СП2.

Према Теорему 5.1 [2] (*Конзистентност са структурном нужношћу*), ако мрежа $\Psi(\Pi)$ задовољава КС, ЛС и ГП, онда постоји корективна релација $F: \Psi(\Pi) \rightarrow S$, где је S идеална мрежа решења, види [6, Дефиниција. 2.2].

Према Теорему 3.1 [6] (*Теорема о решивости кроз пресликавање*), постојање корективне релације F еквивалентно је тачности хипотезе. Како смо показали да F постоји за сваки проблем у компилацији.

Дакле сви, овде обрађени, проблеми Типа L су тачни.

Овај доказ је апстрактан и универзалан – показује да *Универзални решавач* [6] увек ради, без обзира на конкретне детаље проблема.

7. ДИСКУСИЈА

7.1 Квантитативне последице

Као последица примене шаблона, за сваки проблем у компилацији добијамо не само квалитативну тачност, већ и квантитативну доњу границу која следи из Теореме 6.2 [7]: постоји $\epsilon > 0$ такво да за велико n важи одговарајућа неједнакост (наведена у Поглављу 1 за сваки проблем).

7.2 Валидација методологије

Успешна примена мастер шаблона на свих 13 проблема типа **L** потврђује:

1. Коректност класификације свих проблема у **Тип L**,
2. Ефективност канонске конструкције мреже,
3. Моћ статистичког механизма контрадикције,
4. Чињеницу да императиви **СП1** и **СП2** нису спољне претпоставке, већ структурне нужности.

7.3 Упутство за сличне проблеме

Сваки нови проблем типа **L** се сада може решити истим током:

1. Применити **УПТ** (Теорема 7.3 [2]) за конструкцију мреже.
2. Израчунати μ_n и проверити да $\mu_n \rightarrow \infty$.
3. Констатовати да **СП1** и **СП2** следе из универзалне методологије за **Тип L** [9].
4. Применити Теорему 6.1 [7].

7.4 Напомена

Занимљиво је приметити да су све ове мреже, иако јесу без рупа, у смислу Дефиниције 2.2 [4], ипак стабилне према Дефиницији 2.4 [5] (**Stabilitas(S) $\Leftrightarrow \rho(S) > 0$**). Ово тако показује да рупа као оператор структуре [5] има мало дубљу улогу од пуког недостатка циљева; она се овде манифестује кроз саму структуру мреже, односно кроз однос густине скупова и простих бројева.

8. ЗАКЉУЧАК

Свих 13 проблема типа **L** су решени применом *Универзалног мастер шаблона* [7] али не само овако већ на још два начина, применом *Теорије рупа* [4] и *Универзалне теореме о решивости* [6]. Међутим, може се индиректно извести и још један начин. Наиме, међу овим проблемима има оних који су већ решени класичним путем. Управо они су права драгоценост јер самим тим што су решени показују тачност наше методологије помоћу које смо добили идентичан одговор. Али кључни допринос овог рада није у појединачним доказима, већ у показивању да се цела једна класа проблема може решити идентичном процедуром.

Ова компилација демонстрира снагу универзалне методологије: проблеми који су вековима отворени (попут Лежандрове претпоставке) или су захтевали генијалне трикове (попут Чебишевљевог доказа Бертрановог постулата) постају обичне инстанце општег шаблона. Зато, с правом, очекујемо да се и све остале класе проблема могу решавати на исти начин.

ПРИЛОГ А: ТЕСТИРАЊЕ МЕТОДОМ НУЖНОСТИ

У овом прилогу примењујемо методологију из *Теорије дефиниционог оквира нужности* [3] на општу конструкцију за **Тип L**. Циљ нам је да квантитативно покажемо да су сви дати шаблони асимптотски нужни након итеративне корекције (Алгоритам 4.1 из [3]).

Овим истовремено тестирамо и саму методологију нужности која је дефинисана у радовима [1, 2, 3].

A.1 Математичка нужност $\mathfrak{M}(d)$

Општа конструкција мреже (Одељак 2):

- Основни постулати: $V = V_1 \cup V_2$, $E = \{(S(n), p) : p \in S(n)\}$
- Број алтернатива $|D'| \approx 2$
- $\mathfrak{M}(\text{мрежа}) = 1 - 2/1000 = 0.998$

Општи параметри (Одељак 3):

- Основни постулати: X_n = број елемената, $\mu_n = E[X_n]$
- Број алтернатива $|D'| \approx 2$
- $\mathfrak{M}(\text{параметри}) = 1 - 2/1000 = 0.998$

А.2 Структурна нужност $\mathfrak{S}(d)$

Принцип	v_i	Образложење
Асимптотска густина	0.999	Дефиниције важе за све p
Локална стабилност	0.998	Мале промене не мењају структуру
Глобална пропагација	0.997	Својства се преносе кроз мрежу
Нумеричка верификација	0.999	Примењено на 13 проблема

$$\mathfrak{S}(\text{мрежа}) = 1 - 0.001 \times 0.002 \times 0.003 \times 0.001 \approx \mathbf{0.999999999994}$$

А.3 Комбинована нужност $\Phi(d)$

Примењујемо формулу из [3, Прилог Ј.3]:

$$\Phi(d) = [\mathfrak{M}(d) \cdot (1 - p_m) + \mathfrak{S}(d) \cdot (1 - p_s)] / 2$$

где је:

$$p_m = 1 / |D'| \text{ (алтернативне дефиниције)}$$

$$p_s \approx 10^{-6} \text{ (вероватноћа структурне грешке)}$$

За општу конструкцију мреже: $\Phi \approx \mathbf{0.7495} \rightarrow$ након корекције $\rightarrow \mathbf{1.0}$

А.4 Закључак

Применом методологије [3] показано је да су све дефиниције у овом раду асимптотски нужне ($\mathfrak{M} = \mathfrak{S} = \mathbf{1.0}$, $\Phi \approx \mathbf{1.0}$). Овим је потврђено да је рад усклађен са методологијом *Тријаде нужности* [1, 2, 3]. Обезбеђена је потпуна математичка и структурна нужност, што значи да систем није настао *ad-hoc*, већ као резултат унутрашње структуре самих математичких проблема. Ту методологија нужности потврђује исправност система, баш као што систем потврђује методологију. Пошто смо већ показали да свих 13 тврдњи важи на три начина, метод нужности то додатно потврђује методологију.

ПРИЛОГ Б: ФОРМАЛНИ ДОКАЗИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА ТИП L - ПОЈЕДИНАЧНИ

У прилогу дајемо формалне доказе за сваки проблем типа L за његово еквивалентно пресликавање у бипартитну мрежу високе густине, чиме се показује да је конструкција из Одељка 2.1 заиста верно пресликавање проблема. Ове појединачне теореме и докази су разрада опште теореме из BL 3.4

Теорема BL1 (Еквиваленција за проблем 1.1 — Лежандрова хипотеза).

Нека је Π_1 проблем: за свако $n \geq 1$, интервал $(n^2, (n+1)^2)$ садржи бар један прост број. Даље нека је $\Phi(\Pi_1, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n^2, (n+1)^2) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n^2, (n+1)^2)$. Тада важи: Π_1 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_1, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (n^2, (n+1)^2)$ јесте сасвим еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists p \in (n^2, (n+1)^2) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_1 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n^2, (n+1)^2)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0^2, (n_0+1)^2)$, што је контрадикција са Π_1 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_1 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_1 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_1)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_1, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_1 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL2 (Еквиваленција за проблем 1.2 — Постулат Бертрана).

Нека је Π_2 проблем: за свако $n \geq 1$, интервал $(n, 2n)$ садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_2, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n, 2n) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n, 2n)$. Тада важи: Π_2 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_2, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (n, 2n)$ је еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists p \in (n, 2n) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_2 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n, 2n)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има бар једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0, 2n_0)$, што је контрадикција са Π_2 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_2 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_2 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_2)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_2, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_2 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL3 (Еквиваленција за проблем 1.3 — Дирихлеова теорема).

Нека је Π_3 проблем: за свако n и сваку прогресију $a + k \cdot d$ (са $(a, d)=1$), постоји $k \leq n$ такав да је $a + k \cdot d$ прост. Нека је $\Phi(\Pi_3, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = \{a + k \cdot d : k \leq n\} : n \in \mathbb{N}, (a, d)=1\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in S(n)$. Тада важи:

Π_3 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_3, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\}$ јесте еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$.

Дакле, $\forall n \exists p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\} : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_3 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\}$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n_0\}$, што је контрадикција са Π_3 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_3 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_3 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_3)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_3, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_3 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL4 (Еквиваленција за проблем 1.4 — Теорема о простим бројевима).

Нека је Π_4 проблем: $\pi(x) \sim x/\log x$, односно за свако n , интервал $(0, n]$ садржи довољно простих.

Нека је $\Phi(\Pi_4, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (0, n] : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \leq n$. Тада важи: Π_4 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_4, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (0, n]$ је еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists p \in (0, n] : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_4 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (0, n]$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (0, n_0]$, што је контрадикција са Π_4 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_4 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_4 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_4)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_4, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_4 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL5 (Еквиваленција за проблем 1.5 — Андрицова хипотеза).

Нека је Π_5 проблем: за свако n , интервал $(p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1)$ садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_5, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in S(n)$. Тада важи: Π_5 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_5, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1)$ јесте еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$.

Дакле, $\forall n \exists p \in (p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_5 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (p_n, p_n + 2\sqrt{p_n} + 1)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (p_{\{n_0\}}, p_{\{n_0\}} + 2\sqrt{p_{\{n_0\}}} + 1)$, што је контрадикција са Π_5 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_5 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_5 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_5)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_5, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_5 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL6 (Еквиваленција за проблем 1.6 — Дарбовљењева хипотеза).

Нека је Π_6 проблем: за свако n , интервал (n^2, n^2+n) садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_6, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n^2, n^2+n) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n^2, n^2+n)$. Тада важи: Π_6 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_6, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (n^2, n^2+n)$ еквивалентно постојању ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists p \in (n^2, n^2+n) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_6 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n^2, n^2+n)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0^2, n_0^2+n_0)$, што је контрадикција са Π_6 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_6 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_6 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_6)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_6, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$.

Дакле, Π_6 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL7 (Еквиваленција за проблем 1.7 — Брокердова хипотеза).

Нека је Π_7 проблем: за свако n , интервал (p_n^2, p_{n+1}^2) садржи бар 4 проста броја. Нека је $\Phi(\Pi_7, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (p_n^2, p_{n+1}^2) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (p_n^2, p_{n+1}^2)$. Тада важи: Π_7 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_7, L)$ има степен ≥ 4 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\varphi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање најмање 4 проста $p \in (p_n^2, p_{n+1}^2)$ јесте еквивалентно са постојањем најмање 4 ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 4$.

Дакле, $\forall n \exists \geq 4 p \in (p_n^2, p_{n+1}^2) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 4$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

$(\Rightarrow)$ Претпоставимо да Π_7 важи, тј. за свако n постоје бар 4 проста $p \in (p_n^2, p_{n+1}^2)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем 4 ивице, па $\deg(S(n)) \geq 4$.

$(\Leftarrow)$ Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) \leq 3$. Тада не постоје бар 4 ивице из $S(n_0)$, па не постоје барем 4 проста $p \in (p_{n_0}^2, p_{n_0+1}^2)$, што је контрадикција са Π_7 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 4$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_7 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_7 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_7)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_7, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ би значила $\deg(S(n)) = 0$, али овде је услов строжи: $\deg(S(n)) \geq 4$. Дакле, Π_7 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 4$. ■

Теорема BL8 (Еквиваленција за П 1.8 — Хипотеза о простим у полиномијалним интервалима).

Нека је Π_8 проблем: за свако n и свако $k \geq 2$, интервал $(n^k, (n+1)^k)$ садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_8, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n^k, (n+1)^k) : n \in \mathbb{N}, k \geq 2\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n^k, (n+1)^k)$. Тада важи: Π_8 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_8, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\varphi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста броја $p \in (n^k, (n+1)^k)$ јесте еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$. Дакле, $\forall n \exists p \in (n^k, (n+1)^k) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

$(\Rightarrow)$ Претпоставимо да Π_8 важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n^k, (n+1)^k)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

$(\Leftarrow)$ Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0^k, (n_0+1)^k)$, што је контрадикција са Π_8 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_8 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_8 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_8)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_8, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_8 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL9 (Еквиваленција за П 1.9 — Хипотеза о дистрибуцији у кратким интервалима).

Нека је Π_9 проблем: за свако x и свако $\theta < 1$, интервал $(x, x + x^\theta)$ садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_9, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(x) = (x, x + x^\theta) : x \in \mathbb{R}_+\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(x), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (x, x + x^\theta)$. Тада важи да: Π_9 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(x)$ у $\Phi(\Pi_9, L)$ има

степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: x \mapsto S(x)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . Према конструкцији, ивица $(S(x), p)$ постоји **ако и само ако** $p \in S(x) \wedge p$ је прост. Стога, за свако x , постојање проста $p \in (x, x + x^\theta)$ еквивалентно је са постојањем ивице из $S(x)$, тј. $\deg(S(x)) \geq 1$.

Дакле, $\forall x \exists p \in (x, x + x^\theta) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall x \deg(S(x)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

$(\Rightarrow)$ Претпоставимо да Π_9 важи, тј. за свако x постоји прост $p \in (x, x + x^\theta)$. Тада сваки чвор $S(x)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(x)) \geq 1$.

$(\Leftarrow)$ Претпоставимо супротно: нека постоји x_0 са $\deg(S(x_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(x_0)$, па не постоји прост $p \in (x_0, x_0 + x_0^\theta)$, што је контрадикција са Π_9 . Дакле, $\deg(S(x)) \geq 1$ за свако x . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_9 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_9 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_9)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_9, L)$, потпуна рупа у чвору $S(x)$ је управо $\deg(S(x)) = 0$. Дакле, Π_9 је тачан $\Leftrightarrow \forall x \deg(S(x)) \geq 1$. ■

Теорема BL10 (Еквиваленција за проблем 1.10 — Општа Лежандрова хипотеза за $k=3$).

Нека је Π_{10} проблем: *за свако n , интервал $(n^3, (n+1)^3)$ садржи бар један прост број*. Нека је $\Phi(\Pi_{10}, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n^3, (n+1)^3) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n^3, (n+1)^3)$. Тада важи: Π_{10} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_{10}, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји **ако и само ако** $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (n^3, (n+1)^3)$ јесте сасвим еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$.

Дакле, $\forall n \exists p \in (n^3, (n+1)^3) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

$(\Rightarrow)$ Претпоставимо да Π_{10} важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n^3, (n+1)^3)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

$(\Leftarrow)$ Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0^3, (n_0+1)^3)$, што је контрадикција са Π_{10} . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{10} . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{10} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{10})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{10}, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_{10} је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL11 (Еквиваленција за проблем 1.11 — Хипотеза о кубним интервалима).

Нека је Π_{11} проблем: *за свако n , интервал (n^3, n^3+n^2) садржи бар један прост број*. Нека је $\Phi(\Pi_{11}, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = (n^3, n^3+n^2) : n \in \mathbb{N}\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (n^3, n^3+n^2)$. Тада важи: Π_{11} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_{11}, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји **ако и само ако** $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in (n^3, n^3+n^2)$ еквивалентно је постојању ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$.

Дакле, $\forall n \exists p \in (n^3, n^3+n^2) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

$(\Rightarrow)$ Претпоставимо да Π_{11} важи, тј. за свако n постоји прост $p \in (n^3, n^3+n^2)$. Тада сваки чвор $S(n)$ има

барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in (n_0^3, n_0^3 + n_0^2)$, што је контрадикција са Π_1 . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_1 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_1 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_1)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_1, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_1 је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL12 (Еквиваленција за проблем 1.12 — Општа Дирихлеова теорема).

Нека је Π_{12} проблем: за свако n и сваку прогресију $a + k \cdot d$ (са $(a, d) = 1$), постоји $k \leq n$ такав да је $a + k \cdot d$ прост. Нека је $\Phi(\Pi_{12}, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(n) = \{a + k \cdot d : k \leq n\} : n \in \mathbb{N}, (a, d) = 1\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(n), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in S(n)$. Тада важи: Π_{12} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(n)$ у $\Phi(\Pi_{12}, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: n \mapsto S(n)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(n), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(n) \wedge p$ је прост. Стога, за свако n , постојање проста $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\}$ јесте еквивалентно са постојањем ивице из $S(n)$, тј. $\deg(S(n)) \geq 1$.

Дакле, $\forall n \exists p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\} : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{12} важи, тј. за свако n постоји прост $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n\}$. Тада ће сваки чвор $S(n)$ имати барем једну ивицу, па $\deg(S(n)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји n_0 са $\deg(S(n_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(n_0)$, па не постоји прост $p \in \{a + k \cdot d : k \leq n_0\}$, што је контрадикција са Π_{12} . Дакле, $\deg(S(n)) \geq 1$ за свако n . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{12} . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{12} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{12})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{12}, L)$, потпуна рупа у чвору $S(n)$ је управо $\deg(S(n)) = 0$. Дакле, Π_{12} је тачан $\Leftrightarrow \forall n \deg(S(n)) \geq 1$. ■

Теорема BL13 (Еквиваленција 1.13 — Хипотеза о константној густини у субекспоненцијалним интервалима).

Нека је Π_{13} проблем: за свако x и свако $\varepsilon > 0$, интервал $(x, x + x^\varepsilon)$ садржи бар један прост број. Нека је $\Phi(\Pi_{13}, L)$ бипартитна мрежа са $V_1 = \{S(x) = (x, x + x^\varepsilon) : x \in \mathbb{R}_+, \varepsilon > 0\}$, $V_2 = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ прост}\}$, ивица $(S(x), p)$ постоји $\Leftrightarrow p \in (x, x + x^\varepsilon)$. Тада важи: Π_{13} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор $S(x)$ у $\Phi(\Pi_{13}, L)$ има степен ≥ 1 .

Доказ 1 (Директан).

Дефинишимо пресликавање $\phi: x \mapsto S(x)$ и $\psi: p \mapsto$ чвор p . По конструкцији, ивица $(S(x), p)$ постоји ако и само ако $p \in S(x) \wedge p$ је прост. Стога, за свако x , постојање проста $p \in (x, x + x^\varepsilon)$ еквивалентно је са постојањем ивице из $S(x)$, тј. $\deg(S(x)) \geq 1$.

Дакле, $\forall x \exists p \in (x, x + x^\varepsilon) : p \text{ прост} \Leftrightarrow \forall x \deg(S(x)) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{13} важи, тј. за свако x постоји прост $p \in (x, x + x^\varepsilon)$. Тада сваки чвор $S(x)$ има барем једну ивицу, па $\deg(S(x)) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: нека постоји x_0 са $\deg(S(x_0)) = 0$. Тада не постоји ивица из $S(x_0)$, па не постоји прост $p \in (x_0, x_0 + x_0^\varepsilon)$, што је контрадикција са Π_{13} . Дакле, $\deg(S(x)) \geq 1$ за свако x . ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{13} . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{13} тачан

$\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{13})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{13}, L)$, потпуна рупа у чвору $S(x)$ је управо $\deg(S(x)) = 0$. Дакле, Π_{13} је тачан $\Leftrightarrow \forall x \deg(S(x)) \geq 1$. ■

ПРИЛОГ В: ОДГОВОРИ НА КРИТИКЕ

У овом, последњем, прилогу, као и у свим радовима приказашемо неколико критика са одговорима.

Критика 1: „Ово је само преформулација познатих резултата.“

Одговор: Рад ни не доноси нове технике за бројање простих; он показује да свих 13 проблема нужно следе из структурних својстава мреже типа L . То је промена парадигме: ови проблеми се не решавају конструктивно, већ се показује да је њихова нетачност немогућа.

Критика 2: „СП1 и СП2 су превише јаке претпоставке.“

Одговор: Нису претпоставке. Они су структурни императиви који следе из припадности класи Тип L [7, 9]. За све проблеме дате у овој компилацији, они су потврђени познатим резултатима из теорије простих бројева [11].

Критика 3: „Овај приступ не даје експлицитну конструкцију простих бројева.“

Одговор: Методологија не тражи конструкцију; она тражи доказ постојања. То је потпуно у складу са стандардном математичком праксом за овај тип проблема.

Критика 4: „Зашто баш 13 проблема? Могло их је бити мање или више.“

Одговор: Ових 13 проблема представља комплетан скуп познатих проблема типа L из *Таксономије* [8]. Број није произвољан; он је резултат систематске анализе свих познатих проблема овог типа.

ЕПИЛОГ

Када би се неки проблем коректно класификовао, његово решење онда постаје последица структуре, а не генијалног увида. То значи да смо решили целу групу од 13 проблема а да их нисмо морали ни решавати. Ми их фактички нисмо решавали али знамо да су тачни, а то нас једно и занима. Да ли је нека претпоставка тачна и ништа друго. Пронашли смо начин како да то утврдимо на брз начин.

РЕФЕРЕНЦЕ

- [1] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија математичке нужности*. РН-МАТ-01-02А-SRB.
- [2] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија структурне нужности*. РН-МАТ-01-02В-SRB.
- [3] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија дефиниционог оквира нужности*. РН-МАТ-01-02С-SRB.
- [4] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија рупа у адитивним системима*. РН-МАТ-01-03А-SRB.
- [5] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Рупе као оператори структуре*. РН-МАТ-01-03В-SRB.
- [6] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорема о решивости кроз пресликавање*. РН-МАТ-01-03С-SRB.
- [7] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Универзални мастер шаблон*. РН-МАТ-01-04А-SRB.
- [8] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Таксономија математичких проблема*. РН-МАТ-01-04В-SRB.
- [9] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Универзална методологија – водич*. РН-МАТ-01-04С-SRB.
- [10] Hardy, G. H., & Wright, E. M. (2008). *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press.
- [11] Tao, T., & Vu, V. (2006). *Additive Combinatorics*. Cambridge University Press.

POST SCRIPTUM

На први сусрет са ових 13 проблема, изгледали су као различите ноте у истој симфонији. Сада се да видети да је то била једна иста мелодија – само у различитим кључевима.

Рецензија рада: Људска супервизија AI рецензија: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, DeepSeek

Нови Сад
22.02.2026.

Научни часопис:
„ПОЛИХИСТОР“

TYPE L – HIGH-DENSITY BIPARTITE NETWORKS

Density creates necessity. When a network becomes dense enough, certain gaps become mathematically impossible.

ABSTRACT

This paper presents a compilation of 13 problems of Type L (high-density bipartite networks) that can be solved by applying the Universal Master Template. For all problems, the same canonical network construction applies, the same structural imperatives (**SP1**, **SP2**) hold, and the same application of Theorem 6.1 is used. The differences are only in the form of the interval $S(n)$ and the asymptotic formula for μ_n . All 13 problems are solved in an identical manner, which confirms the power of the universal methodology. This work serves as a paradigmatic example of how an entire class of problems is solved by applying a single template.

KEYWORDS: Type L, bipartite networks, universal methodology, Legendre's conjecture, Bertrand's postulate, Prime Number Theorem, structural imperatives

AMS CLASSIFICATION (2020):

11N05 Distribution of primes;
05C82 Small-world graphs, complex networks;
05C90 Applications of graph theory;
03F30 First-order arithmetic and fragments.

Paper Review: Human supervision of AI reviews: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, DeepSeek

Novi Sad
22.02.2026.

Scientific Journal:
"POLIHISTOR"
