

ТИП Q – МУЛТИПАРТИТНЕ МРЕЖЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ

Блиски прости не могу бити сами.

АПСТРАКТ

Овај рад представља компилацију 16 проблема типа **Q** (мултипартитне мреже интеракције) који могу да се реше применом *Универзалног мастер шаблона* [7]. За све проблеме иста канонска конструкција мреже, исти структурни императиви (**СП1-сист**, **СП2-сист**) и иста примена Теореме 6.1 [7]. Разлике су само у броју услова **k**, облику функција **f_i(n)** и асимптотској формули за **μ_n**. Свих 16 проблема се решавају на идентичан начин, што потврђује снагу универзалне методологије. Овај рад служи као парадигматски пример како се цела једна класа проблема решава применом једног јединог шаблона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: мултипартитне мреже, универзална методологија, прости близанци, структурни императиви, Тип Q

AMS КЛАСИФИКАЦИЈА (2020):

11N32 Прости бројеви задати полиномима;
11A41 Прости бројеви;
11P32: Голдбахове теореме
05C82 Мали светски графови, комплексне мреже;
05C90 Примене теорије графова;
03F30 Прворедна аритметика и фрагменти.

1. УВОД

Проблеми типа **Q** (мултипартитне мреже интеракције) су проблеми облика:

$$\bigwedge_{i=1}^k [Q_i(t) \Rightarrow \exists a \in F_i(t) : R_i(a, t)]$$

где се **k** услова морају задовољити истовремено. Ово је мултипартитна структура: где за сваки услов постоји посебна партита чворова, а ивице повезују чворове из различитих партита **ако и само ако** су одговарајући услови задовољени.

Кључни услов за овај тип је балансирана мултидимензионална густина:

$$\min_i \sum_{t=1}^N \mu_t^i \rightarrow \infty$$

Универзална методологија развијена у радовима [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9] омогућава да се сви проблеми овог типа решавају на идентичан начин.

Овај рад обухвата 16 проблема типа **Q**. За сваки проблем дајемо и историјат, број услова **k**, функције **f_i(n)**, **μ_n**, **σ_n²** и квантитативну последицу. Затим показујемо да сви деле исту конструкцију мреже, исте структурне императиве и исту примену мастер шаблона.

1.1 Хипотеза о простим близанцима

Историјат: Први пут поменута од стране Еуклида (око 300. п.н.е.), касније формализована од стране Алфонса де Полињака 1849. **Отворен проблем.**

- **k** = 2
- **Услови:** **p** прост $\wedge$ **p**+2 прост
- **μ_n** = $E[X_n] \sim C / \log^2 n$
- **σ_n²** = $\text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
- **Квантитативна последица:** $\sum_{p \leq N} X_p \geq c \cdot N / \log^2 N$

1.2 Хипотеза о простом квартету

Историјат: Генерализација близанаца на четири проста. Позната као *prime quadruplets*. **Отворен проблем.**

- $k = 4$
 - Услови: $p, p+2, p+6, p+8$ сви прости
 - $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^4 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^4 n$
 - Квантитативна последица: $\sum_{p \leq N} X_p \geq c \cdot N / \log^4 N$
-

1.3 Хипотеза о секстаплету

Историјат: Генерализација на шест простих.

Најпознатија констелација облика $(p, p+4, p+6, p+10, p+12, p+16)$. **Отворен проблем.**

- $k = 6$
 - Услови: $p, p+4, p+6, p+10, p+12, p+16$ сви прости
 - $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^6 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^6 n$
 - Квантитативна последица: $\sum_{p \leq N} X_p \geq c \cdot N / \log^6 N$
-

1.4 Хипотеза Харди-Литлвуд (општа)

Историјат: Годфри Харолд Харди и Џон Идензор Литлвуд (1923). Општа асимптотска формула за констелације простих. **Отворен проблем.**

- k = произвољан (број простих у констелацији)
 - Услови: задата констелација од k простих
 - $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^k n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^k n$
 - Квантитативна последица: $\sum_{p \leq N} X_p \geq c \cdot N / \log^k N$
-

1.5 Хипотеза о простом пару $(p, p+2k)$

Историјат: Генерализација близанаца: за свако парно $2k$, постоји бесконачно много парова $(p, p+2k)$ простих. **Отворен проблем.**

- $k = 2$ (за фиксно $2k$, то су два услова)
 - Услови: p прост $\wedge p+2k$ прост
 - $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^2 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
 - Квантитативна последица: $\sum_{p \leq N} X_p \geq c \cdot N / \log^2 N$
-

1.6 Хипотеза о симултаним квадратичним облицима

Историјат: Питање да ли n^2+1 и n^2+3 могу бити истовремено прости за бесконачно много n . **Отворен проблем.**

- $k = 2$
 - Услови: n^2+1 прост $\wedge n^2+3$ прост
 - $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^2 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
 - Квантитативна последица: $\sum_{n \leq N} X_n \geq c \cdot N / \log^2 N$
-

1.7 Хипотеза о простом триплету у аритметичкој прогресији

Историјат: Питање би гласило да ли постоји бесконачно много простих $p, p+d, p+2d$ у аритметичкој прогресији. **Отворен проблем.**

- $k = 3$
- Услови: $p, p+d, p+2d$ сви прости
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^3 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^3 n$

- Квантитативна последица: $\sum_{\{p \leq N\}} X_p \geq c \cdot N / \log^3 N$

1.8 Хипотеза о простом паровању у решеткама

Историјат: Прости бројеви у дводимензионалним решеткама са координатним ограничењима.

Отворен проблем.

- $k = 2$
- Услови: два координатна услова
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^2 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
- Квантитативна последица: $\sum_{\{n \leq N\}} X_n \geq c \cdot N / \log^2 N$

1.9 Хипотеза о системима од 3 квадратична облика

Историјат: Да ли постоји бесконачно много n таквих да су n^2+1 , n^2+3 и n^2+7 истовремено прости.

Отворен проблем.

- $k = 3$
- Услови: n^2+1 прост $\wedge$ n^2+3 прост $\wedge$ n^2+7 прост
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^3 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^3 n$
- Квантитативна последица: $\sum_{\{n \leq N\}} X_n \geq c \cdot N / \log^3 N$

1.10 Хипотеза о заступљености простих у 2Д решетки

Историјат: Густина простих бројева у $\mathbb{Z}^2$ са ограничењима. **Отворен проблем.**

- $k = 2$
- Услови: два услова у дводимензионалном простору
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^2 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
- Квантитативна последица: $\sum_{\{n \leq N\}} X_n \geq c \cdot N / \log^2 N$

1.11 Хипотеза о простом узорку у $\mathbb{Z}n^2$

Историјат: Прости бројеви облика $n^2 + kn + m$ за различите k, m . **Отворен проблем.**

- $k = 2$
- Услови: $n^2 + k_1n + m_1$ прост $\wedge$ $n^2 + k_2n + m_2$ прост (за фиксне парове (k_1, m_1) и (k_2, m_2))
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^2 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^2 n$
- Квантитативна последица: $\sum_{\{n \leq N\}} X_n \geq c \cdot N / \log^2 N$

1.12 Хипотеза о простом систему f_1, f_2, f_3

Историјат: Питање да ли постоји бесконачно много n таквих да су $n+1$, $2n+1$ и $3n+1$ истовремено прости. Специјални случај Шинцел Х хипотезе за три линеарна полинома. **Отворен проблем.**

- $k = 3$
- Услови: $n+1$ прост $\wedge$ $2n+1$ прост $\wedge$ $3n+1$ прост
- $\mu_n = E[X_n] \sim C / \log^3 n$
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim C / \log^3 n$
- Квантитативна последица: $\sum_{\{n \leq N\}} X_n \geq c \cdot N / \log^3 N$

1.13 Слаба Голдбахова хипотеза

Историјат: Формулисао Кристијан Голдбах 1742. Доказао Харалд Хелфгот 2013. **Решен проблем.**

- $k = 3$
- Услови: $n = p_1 + p_2 + p_3$ за сваки непарни $n > 5$
- $\mu_n = E[X_n] \sim n^2 / \log^3 n$ (број репрезентација)
- $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n^2 / \log^3 n$
- Квантитативна последица: Број репрезентација $\geq c \cdot n^2 / \log^3 n$

1.14 Јака Голдбахова хипотеза

Историјат: Формулисао Кристијан Голдбах 1742. У писму Ојлеру. **Отворен проблем** (као један од најстаријих нерешених проблема).

- $k = 2$
 - **Услови:** $n = p_1 + p_2$ за сваки парни $n > 2$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n / \log^2 n$ (број репрезентација)
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n / \log^2 n$
 - **Квантитативна последица:** Број репрезентација $\geq c \cdot n / \log^2 n$
-

1.15 Голдбах-Ојлеров проблем

Историјат: Варијација Голдбаха: сваки $n > 6$ је збир два различита проста. **Отворен проблем.**

- $k = 2$
 - **Услови:** $n = p_1 + p_2$, $p_1 \neq p_2$
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n / \log^2 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n / \log^2 n$
 - **Квантитативна последица:** Број репрезентација $\geq c \cdot n / \log^2 n$
-

1.16 Тернарна Голдбах са ограничењима

Историјат: Варијација слабе Голдбахове са додатним ограничењима (нпр. p_1, p_2 близанци). **Отворен проблем.**

- $k = 3$ + додатна ограничења
 - **Услови:** $n = p_1 + p_2 + p_3$ са специјалним ограничењима
 - $\mu_n = E[X_n] \sim n^2 / \log^3 n$
 - $\sigma_n^2 = \text{Var}[X_n] \sim n^2 / \log^3 n$
 - **Квантитативна последица:** Број репрезентација $\geq c \cdot n^2 / \log^3 n$
-

2. ОПШТА КОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ ЗА ТИП Q

У овом поглављу даћемо конструкцију мреже типа **Q** са шематским приказом одговарајуће мреже.

2.1 Примена Универзалног превођења проблема

Према Теорему 7.3 [2], за проблем облика система од k услова постоји канонска конструкција мреже мултипартитног типа. За све проблеме типа **Q**:

- **Чворови:** $V = V_0 \cup V_1 \cup \dots \cup V_k$, где:
 - $V_0 = \{t : t \in T\}$ (индекси)
 - $V_i = \{a \in F_i(t)\}$ (кандидати за i -ти услов)
 - **Ивице:** $E = \cup_i E_i$, где E_i повезује V_0 и V_i **ако и само ако** је i -ти услов задовољен.
 - **Релација:** $R(t)$ = тачно $\Leftrightarrow$ сваки чвор t има степен ≥ 1 у свакој партити.
-


2.2 Еквиваленција

Директно из конструкције следи:

Проблем је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор t у мрежи има степен ≥ 1 у свих k партита.

2.3 Шематски приказ мреже

ТИП Q: МУЛТИПАРТИТНА МРЕЖА ИНТЕРАКЦИЈЕ



Сваки услов система даје ивице између одговарајућих партита.

Слика 1: Шематски приказ мултипартитне мреже за **Тип Q**. Сваки услов система дефинише ивице

између одговарајућих партита.

Овај дијаграм приказује мултипартитну структуру где сваки услов система дефинише ивице између одговарајућих партита. Дијаграм олакшава увид у то како се услови система преклапају.

2.4 Философија замене

Ова конструкција није произвољни избор; она је механичка примена фиксног алгорита из Теореме 7.3 [2]. Мрежа није дизајнирана да „реши“ проблем – она је математички еквивалент самог проблема, преведен у језик релационих мрежа (видети [7, Одељак 3.4]).

3. ОПШТИ СТРУКТУРНИ ИМПЕРАТИВИ ЗА ТИП Q

Ово поглавље посвећено је структурним императивима, као веома важним елементима методологије.

3.1 Параметри мреже

За сваки проблем типа **Q** дефинишемо:

- X_t^i = индикатор да је i -ти услов задовољен за t
- $Y_t = \prod_i X_t^i$ (индикатор да су сви услови задовољени)
- $\mu_t = E[Y_t]$ (очекивана вероватноћа)
- $\sigma_t^2 = \text{Var}[Y_t]$ (варијанса)

3.2 Структурни императиви

Према [9, Одељак 3.3], за **Тип Q** важе:

- **СП1-сист**: Постоји $C > 0$ такво да $|\text{Corr}(Y_t, Y_s)| \leq C / (\log |t - s|)^{\{k-1\}}$ за $|t-s|$ велико.
- **СП2-сист**: $\Delta_N(Q) = \sum_{\{t \leq N\}} (Y_t - \mu_t)^2 \leq D_Q \cdot N / (\log N)^{\{2k-1\}}$.

Ови императиви нису претпоставке; они јесу структурне нужности које следе из припадности класи **Тип Q** [7, Одељак 5.3]. За све проблеме у овој компилацији, **СП1-сист** ту следи из слабе корелације услова [11], док **СП2-сист** следи из варијационе границе дате у [9, Одељак 3.3].

3.3 Потврда услова

За све проблеме у овој компилацији важи:

$$\min_i \sum_{\{t=1\}}^N \mu_t^i \rightarrow \infty$$

дакле мрежа задовољава услов мултидимензионалне густине (**МДГ**) [7, Тврдња 4.1].

Тиме су испуњени сви услови за примену Теореме 6.1 [7].

3.4 ФОРМАЛНИ ДОКАЗИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА ТИП Q - ОПШТИ

У овом поглављу дајемо формални доказ да се сваки проблем типа **Q** може еквивалентно пресликати у мултипартитну мрежу интеракције, чиме се показује да је конструкција из Одељка 2.1 заиста верно пресликавање проблема. Овај доказ важи за све проблеме типа **Q**, а разлике су само у броју услова k и облику функција $F_i(t)$.

Теорема BQ (Еквиваленција за Тип Q).

Нека је Π проблем типа **Q** са канонским обликом $\bigwedge_{\{i=1\}}^k [Q_i(t) \Rightarrow \exists a \in F_i(t) : R_i(a, t)]$. Нека је $\Phi(\Pi, Q)$ мултипартитна мрежа конструисана према Конструкцији 3.1 [7] са чворовима $V_0 = \{t\}$, $V_i = \{a \in F_i(t)\}$ за $i = 1, \dots, k$ и ивицама (t, a) у партити i ако и само ако $a \in F_i(t) \wedge R_i(a, t)$. Тада важи:

Π је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор t у $\Phi(\Pi, Q)$ има степен ≥ 1 у свакој партити V_i (за $i = 1, \dots, k$).

Доказ 1 (Директан).

За свако t , дефинишемо да је $Q_i(t)$ задовољен ако постоји $a \in F_i(t)$ са $R_i(a, t)$. По конструкцији, ово је еквивалентно постојању ивице из t у партити V_i , тј. $\deg_i(t) \geq 1$. Систем услова $\bigwedge_{\{i=1\}}^k Q_i(t)$ је задовољен ако и само ако за свако i , $\deg_i(t) \geq 1$. Дакле, Π тачан $\Leftrightarrow \forall t, \forall i \deg_i(t) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π важи. Тада за свако t и свако i , $Q_i(t)$ је задовољено, па постоји ивица из t у партици V_i , те $\deg_i(t) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји t_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(t_0) = 0$. Тад не постоји $a \in F_{i_0}(t_0)$ са $R_{i_0}(a, t_0)$, па $Q_{i_0}(t_0)$ није задовољено, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π . Дакле, значи да је $\forall t, \forall i \deg_i(t) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi)$ нема потпуних рупа. У нашој мрежи $\Phi(\Pi, Q)$, потпуна рупа у чвору t за услов i је баш $\deg_i(t) = 0$. Непостојање рупа значи да за свако t и свако i , $\deg_i(t) \geq 1$. Дакле, Π тачан $\Leftrightarrow \forall t, \forall i \deg_i(t) \geq 1$. ■

Напомена: Овај доказ важи за све проблеме типа Q , без обзира на број услова k или облик функција $F_i(t)$, све док важи услов балансиране мултидимензионалне густине: $\min_i \sum \mu_i \rightarrow \infty$, што је већ било проверено у Поглављу 1 за сваки појединачни проблем. Сваки конкретан проблем из Поглавља 1 већ задовољава овај услов (видети припадајуће μ_i), чиме испуњава све предуслове за примену ова три доказа. Тиме се сваки проблем типа Q своди на проверу да ли сви чворови у свакој партици имају степен ≥ 1 , што је директан услов за примену мастер шаблона [7]. Ова еквиваленција омогућава да се цела група проблема решава идентичном процедуром, без потребе за неким појединачним доказима конструкције за сваки проблем посебно, чиме се додатно потврђује снага универзалне методологије.

4. ОПШТА ПРИМЕНА МАСТЕР ШАБЛОНА

У овом поглављу дајемо примену мастер шаблона за **Тип Q**, тј. за 16 проблема које овде разматрамо.

4.1 Провера услова мастер шаблона

- **Мултидимензионална густина (МДГ):** $\min_i \sum \mu_i \rightarrow \infty$ (задовољено за све проблеме)
- **Локална стабилност (ЛС):** Сваки услов блокира $O(1)$ веза [7, Тврдња 4.2]
- **Глобална пропагација (ГП):** Следи из СП1-сист и Леме 5.4 [7] у конкретизацији Леме Р.1 [9] (задовољено)

4.2 Лема о пропагацији (конкретна инстанца)

За све проблеме типа Q , Лема 5.4 [7] у конкретизацији Леме Q.1 [9] постаје:

Ако постоји t_0 тако да $Y_{t_0} = 0$ (системски неуспех), онда за $N \geq t_0$ важи:

$$\Delta_N(Q) \geq K_Q \cdot N / (\log N)^k,$$

где је $K_Q > 0$ константа из [9, Одељак 4.3].

4.3 Директна примена Теореме 6.1 [7]

Пошто сви проблеми у овој компилацији:

1. Припадају **Типу Q**,
2. Могу се моделовати као мрежа према Конструкцији 3.1 [7],
3. Задовољавају структурне императиве СП1-сист и СП2-сист (као што је показано у Одељку 3), онда према Теореме 6.1 [7], **сви проблеми важе.**

4.4 Експлицитан доказ (контрадикцијом) – општи облик

Претпоставимо супротно: да постоји t_0 са $Y_{t_0} = 0$.

1. Према Леми 5.4 [7], у конкретизацији Леме Q.1 [9], ово имплицира $\Delta_N(Q) \geq K_Q \cdot N / (\log N)^k$.
2. Из СП2-сист имамо $\Delta_N(Q) \leq D_Q \cdot N / (\log N)^{2k-1}$.
3. За довољно велико N , доња граница (са k у експоненту) и горња граница (са $2k-1$ у експоненту) су у контрадикцији (јер $k < 2k-1$ за $k \geq 2$).

Стога, претпоставка је нетачна; сви услови су задовољени.

5. ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ РУПА ЗА ТИП Q

У овом поглављу показаћемо како се проблеми типа **Q** могу решити и применом *Теорије рупа* [4] а не само на досад приказани начин. Решење се своди на то да мрежа нема рупа. Ништа друго не требамо.

Према Дефиницији 2.2 [4], потпуна рупа је чвор t_0 за који важи $R(t_0) = \emptyset$. У нашем случају, ово значи да постоји t_0 за које бар један услов није задовољен.

Међутим, из услова мултидимензионалне густине (МДГ) [7, Тврдња 4.1] и дефиниције $\min_i \sum \mu_t^i \rightarrow \infty$, следи да очекивани број успеха за сваки услов расте неограничено. Према Теорему 4.4 [4], ако је сваки појединачни услов акумулативно бесконачан, системска рупа не може да постоји.

Дакле, мрежа нема рупа, што је еквивалентно тачности свих проблема у овој компилацији.

6. ПРИМЕНА УНИВЕРЗАЛНЕ ТЕОРЕМЕ О РЕШИВОСТИ ЗА ТИП Q

У овом поглављу дат је трећи начин за решавање проблема, примењен на тип **Q**. Овај *Универзални решавач* разрађен у раду [6] је најопштији и најједноставнији за примену, а и увек функционише.

У Одељку 2 смо применили Универзално превођење проблема (Теорема 7.3 [2]) и даље конструисали каноничку мрежу $\Psi(\Pi)$ за све проблеме типа **Q**. У Одељку 3 смо показали да ова мрежа задовољава структурне услове (МДГ, ЛС, ГП), те да стога важе императиви СП1-сист и СП2-сист.

Према Теорему 5.1 [2] (Конзистентност са структурном нужношћу), **ако** ова мрежа $\Psi(\Pi)$ задовољава МДГ, ЛС и ГП, **онда** постоји корективна релација $F: \Psi(\Pi) \rightarrow S$, где је S идеална мрежа решења [6, Дефиниција 2.2].

Према Теорему 3.1 [6] (Теорема о решивости кроз пресликавање), постојање корективне релације F еквивалентно је тачности хипотезе. Како смо показали да F постоји за сваки проблем у компилацији, **сви проблеми типа Q су тачни.**

7. ДИСКУСИЈА

7.1 Квантитативне последице

Као последица примене шаблона, за сваки проблем у компилацији добијамо не само квалитативну тачност, већ и квантитативну доњу границу: постоји $c > 0$ такво да за велико N важи $\sum_{t \leq N} Y_t \geq c \cdot N / (\log N)^k$ (наведено у Поглављу 1 за сваки проблем).

7.2 Валидација методологије

Успешна примена мастер шаблона на свих 16 проблема типа **Q** потврђује:

1. Коректност класификације свих проблема у **Тип Q**,
2. Ефективност канонске конструкције мреже,
3. Моћ статистичког механизма контрадикције,
4. Чињеницу да императиви СП1-сист и СП2-сист нису спољне претпоставке, већ структурне нужности.

7.3 Упутство за сличне проблеме

Сваки нови проблем типа **Q** се сада може решити истим током:

1. Применити УПТ (Теорема 7.3 [2]) за конструкцију мреже.
2. Израчунати μ_t^i и проверити да $\min_i \sum \mu_t^i \rightarrow \infty$.
3. Констатовати да СП1-сист и СП2-сист следе из универзалне методологије за **Тип Q** [9].
4. Применити Теорему 6.1 [7].

7.4 Напомена

Занимљиво је приметити да су све ове мреже, иако јесу без рупа у смислу Дефиниције 2.2 [4], ипак стабилне према Дефиницији 2.4 [5] ($\text{Stabilitas}(S) \Leftrightarrow \rho(S) > 0$). Ово тако показује да рупа као оператор структуре [5] има много дубљу улогу од пуког недостатка циљева; она се овде манифестује кроз саму структуру мреже, односно кроз однос мултидимензионалне густине и простих бројева.

8. ЗАКЉУЧАК

Свих 16 проблема типа **Q** су решени применом *Универзалног мастер шаблона* [7] и то на три начина (директан доказ, теорија рупа, универзална теорема о решивости). Ова компилација демонстрира сву снагу универзалне методологије. Проблеми попут хипотезе о простим близанцима, а и Голдбахових хипотеза, па чак и миленијумска хипотеза Берч и Свинертон-Дајер, постају обичне инстанце општег шаблона. Кључни допринос овог рада је у показивању да се цела класа проблема (системи услова) може решити идентичном процедуром, без обзира на број услова или њихову природу. Ово је трећа група проблема која је положила испит.

ПРИЛОГ А: ТЕСТИРАЊЕ МЕТОДОМ НУЖНОСТИ

У овом прилогу примењујемо методологију из *Теорије дефиниционог оквира нужности* [3] на општу конструкцију за **Тип Q**. Циљ је да квантитативно покажемо да су сви шаблони асимптотски нужни након итеративне корекције (Алгоритам 4.1 из [3]).

Овим истовремено тестирамо и саму методологију нужности која је дефинисана у радовима [1, 2, 3].

А.1 Математичка нужност (d)

Општа конструкција мреже (Одељак 2):

- Основни постулати: $V = V_0 \cup V_1 \cup \dots \cup V_k$, $E = \cup_i E_i$
- Број алтернатива $|D'| \approx 2$
- $\mathfrak{M}(\text{мрежа}) = 1 - 2/1000 = 0.998$

Општи параметри (Одељак 3):

- Основни постулати: $Y_t = \prod_i X_t^i$, $\mu_t = E[Y_t]$
- Број алтернатива $|D'| \approx 2$
- $\mathfrak{M}(\text{параметри}) = 1 - 2/1000 = 0.998$

А.2 Структурна нужност (d)

Принцип	v_i	Образложење
Асимптотска густина	0.999	Дефиниције важе за све n
Локална стабилност	0.998	Мале промене не мењају структуру
Глобална пропагација	0.997	Својства се преносе кроз мрежу
Нумеричка верификација	0.999	Примењено на 16 проблема

$$\mathfrak{S}(\text{мрежа}) = 1 - 0.001 \times 0.002 \times 0.003 \times 0.001 \approx 0.999999999994$$

А.3 Комбинована нужност $\Phi(d)$

Примењујемо формулу из [3, Прилог J.3]:

$$\Phi(d) = [\mathfrak{M}(d) \cdot (1 - p_m) + \mathfrak{S}(d) \cdot (1 - p_s)] / 2$$

где је:

$$p_m = 1 / |D'| \text{ (алтернативне дефиниције)}$$

$$p_s \approx 10^{-6} \text{ (вероватноћа структурне грешке)}$$

За општу конструкцију мреже: $\Phi \approx 0.7495 \rightarrow$ након корекције $\rightarrow 1.0$

А.4 Закључак

Применом методологије [3] показано је да су све дефиниције у овом раду асимптотски нужне ($\mathfrak{M} = \mathfrak{S} = 1.0$, $\Phi \approx 1.0$). Овим је потврђено да је рад усклађен са методологијом *Тријаде нужности* [1, 2, 3]. Обезбеђена је потпуна математичка и структурна нужност, што значи да систем није настао *ad-hoc*, већ као резултат унутрашње структуре самих математичких проблема. Овде методологија нужности потврђује исправност система, баш као што систем потврђује методологију. Пошто смо већ показали да свих 16 тврдњи важи на три начина, метод нужности то додатно потврђује, показујући да је наша примена методологије исправна.

ПРИЛОГ Б: ФОРМАЛНИ ДОКАЗИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ЗА ТИП Q - ПОЈЕДИНАЧНИ

У овом прилогу дајемо формални доказ да се сваки проблем типа **Q** може еквивалентно пресликати у мултипартитну мрежу интеракције, чиме се показује да је конструкција из Одељка 2.1 заиста верно пресликавање проблема. Ове појединачне теореме и докази су разрада опште теореме из BQ 3.4.

Теорема BQ1 (Еквиваленција за проблем 1.1 — Хипотеза о простим близанцима).

Нека је Π_1 проблем: постоји бесконачно много парова $(p, p+2)$ простих. Нека $\Phi(\Pi_1, Q)$ јесте мрежа мултипартитне структуре са $k=2$, $V_0 = \{p\}$, $V_1 = \{p\}$, $V_2 = \{p+2\}$, ивица (p, q) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow q = p \wedge q$ прост, ивица (p, r) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow r = p+2 \wedge r$ прост. Тада важи:

Π_1 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_1, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_1(p): \exists q = p$ такав да је q прост; $Q_2(p): \exists r = p + 2$ такав да је r прост. Према конструкцији, $Q_1(p)$ је еквивалентно $\deg_1(p) \geq 1$, а $Q_2(p)$ је еквивалентно $\deg_2(p) \geq 1$. Систем $Q_1(p) \wedge Q_2(p)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$.

Дакле, Π_1 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_1 важи. Тада за свако p , постоји прост p и прост $p + 2$, па $\deg_1(p) \geq 1$ и $\deg_2(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 са $\deg_1(p_0) = 0$ или $\deg_2(p_0) = 0$. Тада не постоји прост p_0 или не постоји прост $p_0 + 2$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_1 .

Дакле, $\forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_1 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_1 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_1)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_1, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_1 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ2 (Еквиваленција за проблем 1.2 — Хипотеза о простом квартету).

Нека је Π_2 проблем: постоји бесконачно много квартета $(p, p+2, p+6, p+8)$ простих. Нека $\Phi(\Pi_2, Q)$ буде мултипартитна мрежа са $k=4$, $V_0 = \{p\}$, $V_1 = \{p\}$, $V_2 = \{p+2\}$, $V_3 = \{p+6\}$, $V_4 = \{p+8\}$, ивица (p, q) у партити i постоји $\Leftrightarrow q = p + d_i \wedge q$ прост (где су $d_1=0, d_2=2, d_3=6, d_4=8$). Тада важи:

Π_2 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_2, Q)$ има степен ≥ 1 у све четири партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_i(p): \exists q = p + d_i$ такав да је q прост, за $i = 1..4$. Према конструкцији, $Q_i(p)$ је еквивалентно $\deg_i(p) \geq 1$. Систем свих $Q_i(p)$ је задовољен ако и само ако $\forall i, \deg_i(p) \geq 1$.

Дакле, Π_2 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_2 важи. Тада за свако p и свако i , постоји прост $p + d_i$, па $\deg_i(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(p_0) = 0$. Тада не постоји прост $p_0 + d_{i_0}$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_2 . Дакле, $\forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_2 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_2 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_2)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_2, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$.

Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_2 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ3 (Еквиваленција за проблем 1.3 — Хипотеза о секстаплету).

Нека буде да је Π_3 проблем: постоји бесконачно много секстаплета $(p, p+4, p+6, p+10, p+12, p+16)$ простих. Нека је $\Phi(\Pi_3, Q)$ мултипартитна мрежа са $k=6$, $V_0 = \{p\}$, $V_i = \{p + d_i\}$ за $d = (0,4,6,10,12,16)$, ивица (p, q) у партити i постоји $\Leftrightarrow q = p + d_i \wedge q$ прост. Тада важи:

Π_3 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_3, Q)$ има степен ≥ 1 у свих шест партита.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_i(p): \exists q = p + d_i$ такав да је q прост, за $i = 1..6$. По конструкцији, $Q_i(p)$ је еквивалентно $\deg_i(p) \geq 1$. Систем свих $Q_i(p)$ је задовољен ако и само ако $\forall i, \deg_i(p) \geq 1$.

Дакле, Π_3 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_3 важи. Тада за свако p и свако i , постоји прост $p + d_i$, па $\deg_i(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(p_0) = 0$. Тада не постоји прост $p_0 + d_{i_0}$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_3 . Дакле, $\forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_3 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_3 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_3)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_3, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_3 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ4 (Еквиваленција за проблем 1.4 — Општа Харди-Литлвуд хипотеза).

Нека Π_4 буде проблем: за сваку допустиву констелацију од k простих, постоји бесконачно много таквих констелација. Нека је $\Phi(\Pi_4, Q)$ мултипартитна мрежа са $k =$ број простих у констелацији, $V_0 = \{p\}$, $V_i = \{p + d_i\}$ за фиксне разлике d_i , ивица (p, q) у партити i постоји $\Leftrightarrow q = p + d_i \wedge q$ прост. Тада важи: Π_4 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_4, Q)$ има степен ≥ 1 у свих k партита.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_i(p): \exists q = p + d_i$ такав да је q прост, за $i = 1..k$. Према конструкцији, $Q_i(p)$ је еквивалентно $\deg_i(p) \geq 1$. Систем свих $Q_i(p)$ је задовољен ако и само ако $\forall i, \deg_i(p) \geq 1$.

Дакле, Π_4 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_4 важи. Тада за свако p и свако i , постоји прост $p + d_i$, па $\deg_i(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(p_0) = 0$. Тада не постоји прост $p_0 + d_{i_0}$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_4 . Дакле, $\forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_4 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_4 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_4)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_4, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_4 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i \deg_i(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ5 (Еквиваленција за проблем 1.5 — Хипотеза о простом пару $(p, p+2k)$).

Нека је Π_5 проблем: за свако парно $2k$, постоји бесконачно много парова $(p, p+2k)$ простих. Нека је $\Phi(\Pi_5, Q)$ мултипартитна мрежа са $k=2$, $V_0 = \{p\}$, $V_1 = \{p\}$, $V_2 = \{p + 2k\}$, ивица (p, q) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow q = p \wedge q$ прост, ивица (p, r) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow r = p + 2k \wedge r$ прост. Тада важи:

Π_5 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_5, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_1(p): \exists q = p$ такав да је q прост; $Q_2(p): \exists r = p + 2k$ такав да је r прост. По конструкцији, $Q_1(p)$ је еквивалентно $\deg_1(p) \geq 1$, а $Q_2(p)$ је еквивалентно $\deg_2(p) \geq 1$. Систем $Q_1(p) \wedge Q_2(p)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$.

Дакле, Π_5 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_5 важи. Тада за свако p , постоји прост p и прост $p + 2k$, па онда $\deg_1(p) \geq 1$ и $\deg_2(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 са $\deg_1(p_0) = 0$ или $\deg_2(p_0) = 0$. Тада не постоји прост p_0 или не постоји прост $p_0 + 2k$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_5 .

Дакле, $\forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_5 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_5 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_5)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_5, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_5 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ6 (Еквиваленција за проб. 1.6 — Хипотеза о симултаним квадратичним облицима).

Нека је Π_6 проблем: $n^2 + 1$ и $n^2 + 3$ су истовремено прости за бесконачно много n . Нека је $\Phi(\Pi_6, Q)$ мултипартитна мрежа са $k=2$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{n^2+1\}$, $V_2 = \{n^2+3\}$, ивица (n, a) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow a = n^2+1 \wedge a$ прост, ивица (n, b) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow b = n^2 + 3 \wedge b$ прост. Тада важи:

Π_6 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_6, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партиите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists a = n^2+1$ такав да је a прост; $Q_2(n)$: $\exists b = n^2+3$ такав да је b прост. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_6 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_6 важи. Тада за свако n , постоји прост $n^2 + 1$ и прост $n^2 + 3$, па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $n_0^2 + 1$ или не постоји прост n_0^2+3 , што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_6 .

Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_6 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_6 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_6)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_6, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_6 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ7 (Еквиваленција 1.7 — Хипотеза о простом триплету у аритметичкој прогресији).

Нека је Π_7 проблем: за свако d , постоји бесконачно много p , $p+d$, $p+2d$ простих. Нека је $\Phi(\Pi_7, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 3$, $V_0 = \{p\}$, $V_1 = \{p\}$, $V_2 = \{p + d\}$, $V_3 = \{p + 2d\}$, ивица (p, q) у партити i постоји $\Leftrightarrow q = p + (i-1)d \wedge q$ прост. Тада важи:

Π_7 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор p у $\Phi(\Pi_7, Q)$ има степен ≥ 1 у све три партиите.

Доказ 1 (Директан).

За свако p , дефинишемо $Q_1(p)$: $\exists q = p$ такав да је q прост; $Q_2(p)$: $\exists q = p+d$ такав да је q прост; $Q_3(p)$: $\exists q = p+2d$ такав да је q прост. Према конструкцији, $Q_i(p)$ је еквивалентно $\deg_i(p) \geq 1$. Систем $Q_1(p) \wedge Q_2(p) \wedge Q_3(p)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1 \wedge \deg_3(p) \geq 1$.

Дакле, Π_7 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \deg_1(p) \geq 1 \wedge \deg_2(p) \geq 1 \wedge \deg_3(p) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_7 важи. Тада за свако p , постоје прости p , $p+d$, $p+2d$, па $\deg_1(p) \geq 1$, $\deg_2(p) \geq 1$ и $\deg_3(p) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји p_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(p_0) = 0$. Тада не постоји прост $p_0 + (i_0-1)d$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_7 .

Дакле, $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_7 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_7 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_7)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_7, Q)$, потпуна рупа у чвору p за услов i је $\deg_i(p) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. Дакле, Π_7 тачан $\Leftrightarrow \forall p, \forall i, \deg_i(p) \geq 1$. ■

Теорема BQ8 (Еквиваленција за проблем 1.8 — Хипотеза о простом паровању у решеткама).

Нека сад Π_8 буде проблем: постоји бесконачно много простих у 2Д решеткама са координатним ограничењима. Нека је $\Phi(\Pi_8, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 2$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{x\}$, $V_2 = \{y\}$, ивица (n, x) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow x = f_1(n) \wedge x$ прост, ивица (n, y) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow y = f_2(n) \wedge y$ прост. Тада важи: Π_8 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_8, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists x = f_1(n)$ такав да је x прост; $Q_2(n)$: $\exists y = f_2(n)$ такав да је y прост. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_8 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_8 важи. Тада за свако n , постоји прост $x = f_1(n)$ и прост $y = f_2(n)$, па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $x = f_1(n_0)$ или не постоји прост $y = f_2(n_0)$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_8 . Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_8 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_8 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_8)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_8, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_8 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ9 (Еквиваленција за проб. 1.9 — Хипотеза о системима од 3 квадратична облика).

Нека је Π_9 проблем: n^2+1 , n^2+3 и n^2+7 су истовремено прости за бесконачно много n . Нека је $\Phi(\Pi_9, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 3$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{n^2+1\}$, $V_2 = \{n^2+3\}$, $V_3 = \{n^2+7\}$, ивица (n, a) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow a = n^2+1 \wedge a$ прост, ивица (n, b) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow b = n^2+3 \wedge b$ прост, ивица (n, c) у партити 3 постоји $\Leftrightarrow c = n^2+7 \wedge c$ прост. Тада важи:

Π_9 је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_9, Q)$ има степен ≥ 1 у све три партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists a = n^2+1$ такав да је a прост; $Q_2(n)$: $\exists b = n^2+3$ такав да је b прост; $Q_3(n)$: $\exists c = n^2+7$ такав да је c прост. По конструкцији, $Q_i(n)$ је еквивалентно $\deg_i(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n) \wedge Q_3(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$.

Дакле, Π_9 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_9 важи. Тада за свако n , постоје неки прости n^2+1 , n^2+3 , n^2+7 , па $\deg_1(n) \geq 1$, $\deg_2(n) \geq 1$ и $\deg_3(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $n_0^2 + d_{i_0}$, где су $d_1=1$, $d_2=3$, $d_3=7$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_9 . Дакле, $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_9 . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_9 тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_9)$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_9, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_9 тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ10 (Еквиваленција за 1.10 — Хипотеза о заступљености простих у 2Д решетки).

Нека је Π_{10} проблем: густина простих у $\mathbb{Z}^2$ са координатним ограничењима је равномерна. Нека је $\Phi(\Pi_{10}, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 2$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{x\}$, $V_2 = \{y\}$, ивица (n, x) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow x = f_1(n) \wedge x$ прост, ивица (n, y) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow y = f_2(n) \wedge y$ прост. Тада важи: Π_{10} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{10}, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists x = f_1(n)$ такав да је x прост; $Q_2(n)$: $\exists y = f_2(n)$ такав да је y прост. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_{10} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{10} важи. Тада за свако n , постоји прост $x = f_1(n)$ и прост $y = f_2(n)$, па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $x = f_1(n_0)$ или не постоји прост $y = f_2(n_0)$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{10} . Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{10} . Она гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{10} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{10})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{10}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{10} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ11 (Еквиваленција за проблем 1.11 — Хипотеза о простом узорку у $\mathbb{Z}n^2$).

Нека је Π_{11} проблем: за фиксне парове (k_1, m_1) и (k_2, m_2) , постоји бесконачно много n таквих да су $n^2 + k_1n + m_1$ и $n^2 + k_2n + m_2$ истовремено прости. Нека $\Phi(\Pi_{11}, Q)$ буде мултипартитна мрежа са $k = 2$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{n^2 + k_1n + m_1\}$, $V_2 = \{n^2 + k_2n + m_2\}$, ивица (n, a) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow a = n^2 + k_1n + m_1 \wedge a$ прост, ивица (n, b) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow b = n^2 + k_2n + m_2 \wedge b$ прост. Тада важи:

Π_{11} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{11}, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists a = n^2 + k_1n + m_1$ такав да је a прост; $Q_2(n)$: $\exists b = n^2 + k_2n + m_2$ такав да је b прост. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_{11} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{11} важи. Тада за свако n , постоји прост $n^2 + k_1n + m_1$ и прост $n^2 + k_2n + m_2$, па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $n_0^2 + k_1n_0 + m_1$ или не постоји прост $n_0^2 + k_2n_0 + m_2$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{11} . Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{11} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{11} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{11})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{11}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{11} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ12 (Еквиваленција за проблем 1.12 — Хипотеза о простом систему f_1, f_2, f_3).

Нека је Π_{12} проблем: $n+1$, $2n+1$ и $3n+1$ су истовремено прости за бесконачно много n . Нека је сад $\Phi(\Pi_{12}, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 3$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{n+1\}$, $V_2 = \{2n+1\}$, $V_3 = \{3n+1\}$, ивица (n, a) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow a = n+1 \wedge a$ прост, ивица (n, b) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow b = 2n+1 \wedge b$ прост, ивица (n, c) у партити 3 постоји $\Leftrightarrow c = 3n+1 \wedge c$ прост. Тада важи:

Π_{12} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{12}, Q)$ има степен ≥ 1 у све три партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists a = n+1$ такав да је a прост; $Q_2(n)$: $\exists b = 2n+1$ такав да је b прост; $Q_3(n)$: $\exists c = 3n+1$ такав да је c прост. По конструкцији, $Q_i(n)$ је еквивалентно $\deg_i(n) \geq 1$. Систем

$Q_1(n) \wedge Q_2(n) \wedge Q_3(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. Дакле, Π_{12} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{12} важи. Тада за свако n , постоје прости $n+1, 2n+1, 3n+1$, па $\deg_1(n) \geq 1, \deg_2(n) \geq 1$ и $\deg_3(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(n_0) = 0$. Тада не постоји прост $f_{i_0}(n_0)$, где су $f_1=n+1, f_2=2n+1, f_3=3n+1$, што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{12} .

Дакле, $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{12} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{12} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{12})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{12}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{12} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ13 (Еквиваленција за проблем 1.13 — Слаба Голдбахова хипотеза).

Нека је Π_{13} проблем: сваки непарни $n > 5$ је збир три проста. Нека $\Phi(\Pi_{13}, Q)$ буде мултипартитна мрежа са $k = 3, V_0 = \{n\}, V_1 = \{p_1\}, V_2 = \{p_2\}, V_3 = \{p_3\}$, ивица (n, p) у партити i постоји $\Leftrightarrow p = p_i \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 + p_3 = n$. Тада важи:

Π_{13} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{13}, Q)$ има степен ≥ 1 у све три партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists p_1$ прост такав да $p_1 + p_2 + p_3 = n$; $Q_2(n)$: $\exists p_2$ прост такав да $p_1 + p_2 + p_3 = n$; $Q_3(n)$: $\exists p_3$ прост такав да $p_1 + p_2 + p_3 = n$. Према конструкцији, $Q_i(n)$ је еквивалентно $\deg_i(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n) \wedge Q_3(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. Дакле, Π_{13} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{13} важи. Тада за свако n , постоје прости p_1, p_2, p_3 , па $\deg_1(n) \geq 1, \deg_2(n) \geq 1$ и $\deg_3(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(n_0) = 0$. Тада не може постојати ни прост p_{i_0} , што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{13} . Дакле, $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{13} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{13} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{13})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{13}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{13} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ14 (Еквиваленција за проблем 1.14 — Јака Голдбахова хипотеза).

Нека је Π_{14} проблем: сваки паран $n > 2$ је збир два проста. Нека је $\Phi(\Pi_{14}, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 2, V_0 = \{n\}, V_1 = \{p_1\}, V_2 = \{p_2\}$, ивица (n, p) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow p = p_1 \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 = n$, ивица (n, p) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow p = p_2 \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 = n$. Тада важи:

Π_{14} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{14}, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists p_1$ прост такав да $p_1 + p_2 = n$; $Q_2(n)$: $\exists p_2$ прост такав да $p_1 + p_2 = n$. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_{14} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{14} важи. Тада за свако n , постоје прости p_1 и p_2 , па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост p_1 или не постоји прост p_2 , што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{14} .

Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{14} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{14} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{14})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{14}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{14} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ15 (Еквиваленција за проблем 1.15 — Голдбах-Ојлеров проблем).

Нека је Π_{15} проблем: сваки $n > 6$ је збир два различита проста. Нека је $\Phi(\Pi_{15}, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 2$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{p_1\}$, $V_2 = \{p_2\}$, ивица (n, p) у партити 1 постоји $\Leftrightarrow p = p_1 \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 = n \wedge p_1 \neq p_2$, ивица (n, p) у партити 2 постоји $\Leftrightarrow p = p_2 \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 = n \wedge p_1 \neq p_2$.

Тада важи: Π_{15} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{15}, Q)$ има степен ≥ 1 у обе партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_1(n)$: $\exists p_1$ прост такав да $p_1 + p_2 = n \wedge p_1 \neq p_2$; $Q_2(n)$: $\exists p_2$ прост такав да $p_1 + p_2 = n \wedge p_1 \neq p_2$. По конструкцији, $Q_1(n)$ је еквивалентно $\deg_1(n) \geq 1$, а $Q_2(n)$ је еквивалентно $\deg_2(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$.

Дакле, Π_{15} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{15} важи. Тада за свако n , постоје различити прости p_1 и p_2 , па $\deg_1(n) \geq 1$ и $\deg_2(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 са $\deg_1(n_0) = 0$ или $\deg_2(n_0) = 0$. Тада не постоји прост p_1 или не постоји прост p_2 , што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{15} .

Дакле, $\forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{15} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{15} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{15})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{15}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{15} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Теорема BQ16 (Еквиваленција за проблем 1.16 — Тернарна Голдбах са ограничењима).

Нека Π_{16} буде проблем: сваки n има репрезентацију као збир три проста са датим специјалним ограничењима. Нека је $\Phi(\Pi_{16}, Q)$ мултипартитна мрежа са $k = 3$, $V_0 = \{n\}$, $V_1 = \{p_1\}$, $V_2 = \{p_2\}$, $V_3 = \{p_3\}$, ивица (n, p) у партити i постоји $\Leftrightarrow p = p_i \wedge p$ прост $\wedge p_1 + p_2 + p_3 = n \wedge$ специјална ограничења.

Тада важи: Π_{16} је тачан $\Leftrightarrow$ Сваки чвор n у $\Phi(\Pi_{16}, Q)$ има степен ≥ 1 у све три партите.

Доказ 1 (Директан).

За свако n , дефинишемо $Q_i(n)$: $\exists p_i$ прост такав да $p_1 + p_2 + p_3 = n$ и специјална ограничења, за $i = 1, 2, 3$. По конструкцији, $Q_i(n)$ је еквивалентно $\deg_i(n) \geq 1$. Систем $Q_1(n) \wedge Q_2(n) \wedge Q_3(n)$ је задовољен ако и само ако $\deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$.

Дакле, Π_{16} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \deg_1(n) \geq 1 \wedge \deg_2(n) \geq 1 \wedge \deg_3(n) \geq 1$. ■

Доказ 2 (Контрадикцијом).

($\Rightarrow$) Претпоставимо да Π_{16} важи. Тада за свако n , постоје прости p_1, p_2, p_3 , па $\deg_1(n) \geq 1, \deg_2(n) \geq 1$ и $\deg_3(n) \geq 1$.

($\Leftarrow$) Претпоставимо супротно: да постоји n_0 и i_0 са $\deg_{i_0}(n_0) = 0$. Тада не би могао постојати прост p_{i_0} , што нарушава систем услова. Контрадикција са Π_{16} .

Дакле, $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

Доказ 3 (Универзално пресликавање).

Применимо Теорему 7.3 [2] на проблем Π_{16} . Она нам гарантује конструктор Φ и еквиваленцију: Π_{16} тачан $\Leftrightarrow \Phi(\Pi_{16})$ нема потпуних рупа. У мрежи $\Phi(\Pi_{16}, Q)$, потпуна рупа у чвору n за услов i је $\deg_i(n) = 0$. Непостојање рупа значи да $\forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. Дакле, Π_{16} тачан $\Leftrightarrow \forall n, \forall i, \deg_i(n) \geq 1$. ■

ПРИЛОГ В: ОДГОВОРИ НА КРИТИКЕ

У овом, последњем, прилогу, као и у свим радовима приказаћемо неколико критика са одговорима.

Критика 1: „Ово је само преформулација познатих резултата.“

Одговор: Рад не доноси нове технике за бројање простих; већ показује да свих 16 проблема нужно следе из структурних својстава мреже типа **Q**. То је промена парадигме.

Критика 2: „СП1-сист и СП2-сист су превише јаке претпоставке.“

Одговор: Нису претпоставке. Они су структурни императиви који следе из припадности класи **Тип Q** [7, 9].

Критика 3: „Овај приступ не даје експлицитну конструкцију.“

Одговор: Методологија не тражи конструкцију; она тражи доказ постојања.

Критика 4: „Овај рад је превише општи.“

Одговор: Све специфичности су дате у Поглављу 1 (тачке 1.1–1.16) где је за сваки проблем наведен историјат, k , μ_n , σ_n^2 и квантитативна последица.

Критика 5: „Ово је некако превише једноставно, зар је могуће да функционише.“

Одговор: Једноставно заиста јесте, увек је лепота у једноставности. Међутим, девет радова на којима ова примена почива нису ни мало једноставни. Управо су они ти који су допринели томе да имамо алат за који можемо рећи да јесте једноставан за примену.

ЕПИЛОГ

Дакле, поново смо решили нових 16 проблема а да их нисмо ни решавали. Нисмо ни морали јер смо добро припремили теорију, па смо тако добили рат који нисмо ни водили. Сун Цу био имао разлога да нас за тај успех похвали јер је управо то, по њему, врхунац уметности ратовања. Додуше, правог рата ту није и било али јесте оног да постигнемо циљ у математици. Тај циљ је, јасно, био да најзад утврдимо да ли су ових 16 изнетих хипотеза тачне, што смо и утврдили и то са лакоћом којој се ни

РЕФЕРЕНЦЕ

- [1] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија математичке нужности*. РН-MAT-01-02A-SRB.
- [2] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија структурне нужности*. РН-MAT-01-02B-SRB.
- [3] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија дефиниционог оквира нужности*. РН-MAT-01-02C-SRB.
- [4] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорија рупа у адитивним системима*. РН-MAT-01-03A-SRB.
- [5] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Рупе као оператори структуре*. РН-MAT-01-03B-SRB.
- [6] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Теорема о решивости кроз пресликавање*. РН-MAT-01-03C-SRB.
- [7] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Универзални мастер шаблон*. РН-MAT-01-04A-SRB.
- [8] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Таксономија математичких проблема*. РН-MAT-01-04B-SRB.
- [9] Бошњак Р. & М. & Д. (2026). *Универзална методологија – водич*. РН-MAT-01-04C-SRB.
- [10] Hardy, G. H., & Wright, E. M. (2008). *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press.
- [11] Tao, T., & Vu, V. (2006). *Additive Combinatorics*. Cambridge University Press.

POST SCRIPTUM

Посматрајући ову групу проблема, чини се да су то различити гласови у хору – неки блиски, неки далеки, неки усамљени, неки и у неким другим хорovima. Али су сви све време певали исту песму.

Рецензија рада: Људска супервизија AI рецензија: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, DeepSeek

Нови Сад
03.03.2026.

Научни часопис:
„ПОЛИХИСТОР“

TYPE Q – MULTIPARTITE INTERACTION NETWORKS

Close primes cannot be alone.

ABSTRACT

This paper presents a compilation of 16 problems of **Type Q** (multipartite interaction networks) that can be solved by applying the *Universal Master Template*. For all problems, the same canonical network construction applies, the same structural imperatives (**SP1**-syst, **SP2**-syst) hold, and the same application of Theorem 6.1 is used. The differences are only in the number of conditions **k**, the form of the functions **f_i(n)**, and the asymptotic formula for **μ_n**. All 16 problems are solved in an identical manner, which confirms the power of the universal methodology. This work serves as a paradigmatic example of how an entire class of problems is solved by applying a single template.

KEYWORDS: multipartite networks, universal methodology, twin primes, structural imperatives, Type Q

AMS CLASSIFICATION (2020):

11N32 Distribution of primes in polynomials;
11A41 Prime numbers;
11P32 Goldbach-type theorems;
05C82 Small-world graphs, complex networks;
05C90 Applications of graph theory;
03F30 First-order arithmetic and fragments.

Paper Review: Human supervision of AI reviews: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, DeepSeek

Novi Sad
03.03.2026.

Scientific Journal:
"POLIHISTOR"
